



Pour traiter votre diabète et améliorer vos glycémies, votre médecin vient de vous prescrire
un médicament de la famille **des GLIPTINES**
le

À la posologie de comprimé(s), fois par jour

Comment agit votre médicament ?

Il stimule la sécrétion d'insuline stockée dans votre pancréas, en réponse à l'augmentation de la glycémie (l'insuline est l'hormone qui fait baisser la glycémie).

Il bloque la sécrétion d'une autre hormone (le glucagon) qui fait augmenter le taux de sucre dans le sang.

Quand prendre votre médicament ?

Il peut être pris au cours ou en dehors d'un repas.

En cas d'oubli, prendre le comprimé dès que vous vous en rendez compte.

Quel délai entre le début du traitement et l'effet sur vos glycémies ?

Les glycémies peuvent s'améliorer dès les premiers jours du traitement.

Le traitement sera revu et pourra être adapté en fonction de vos résultats : carnet de surveillance glycémique et hémoglobine glyquée = HbA1c (reflet glycémique global des 3 derniers mois).

Quels sont les principaux effets indésirables possibles ?

Concernant les effets secondaires possibles de ce médicament, reportez-vous à la notice, et si besoin, parlez-en à votre médecin.

Dans la pratique, il est rarement rapporté d'effet secondaire.

Utilisé seul ce médicament est à faible risque d'hypoglycémie

Quelques précautions à prendre :

Avant de prendre un autre médicament de vous-même, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Vous devez toujours signaler votre diabète et votre traitement à tous les professionnels de santé.

*** A retenir ***

➤ Je prends comprimé(s) par jour, au cours ou en dehors d'un repas.