

OBJECTIFS DIABSAT

- **Sensibiliser** les personnes diabétiques à l'importance et à la nécessité du suivi des complications
- **Aider à la prise en charge** des patients diabétiques au plus près de leur domicile


DÉROULEMENT DU DÉPISTAGE

- Durée : **6 mois** (mai à octobre 2021)
- Contexte COVID-19 : reports, annulations
- **15 journées** de dépistage sur RDV, **14 communes**
- **88 patients** dépistés (**moyenne : 6 patients/jour**)
- Contexte COVID-19 : 7 rdv max par jour
- **2,6 examens réalisés / patient** en moyenne sur les 4 possibles

DESCRIPTIF DE LA POPULATION

- Majorité **d'hommes (62,5 %)**
- Moyenne d'âge : **68,4 ans**
- Population en **surpoids** (IMC_{moy} : **31 kg/m²**)
- **95,5 %** de diabétiques de **Type 2**
- **Ancienneté** moyenne du diabète : **14,1 ans**
- Origine du **recrutement** : médecins traitants (55,7 %), presse (26,1 %), infirmier(ère) (9,1 %), repérage du véhicule (3,4 %), internet/réseaux sociaux (3,4 %), pharmaciens (1,1 %), Sophia (1,1 %)

EXAMENS RÉALISÉS




RÉSULTATS DES EXAMENS DE DÉPISTAGE RÉALISÉS

■ Résultat normal


■ Résultat anormal

➤ **Artériopathie des membres inférieurs (mesure des IPS)**




Mesure des Index de Pression systolique à la cheville (anormal < 0,9 ou > 1,3)

➤ **Artériopathie des membres inférieurs (mesure des IPSo)**




Mesure des Index de Pression systolique à l'orteil (anormal < 0,7)

➤ **Neuropathie périphérique**




Test au monofilament

➤ **Risque de plaie du pied**




→ **31,8 %** des patients peuvent bénéficier du remboursement des soins podologiques (Grade 2 et 3)

➤ **Micro-albuminurie**



Mesure semi-quantitative sur bandelette urinaire

➤ **Rétinopathie diabétique (RD)**



Rétinographie non mydriatique