



Pour votre diabète, votre médecin vous a prescrit (nom, dosage) :

Nombre de comprimés : Matin - Midi - Soir (Total : comprimés par jour)

(Au début, augmentation progressive du nombre de comprimés – Dose totale à adapter à votre fonction rénale)



Comment agit votre médicament ?

Il facilite l'action de votre propre insuline et lui permet de mieux agir, en particulier dans les muscles. De plus, il aide à diminuer la libération de sucre par le foie au cours de la nuit.



Quand prendre votre médicament ?

Prenez le comprimé **au milieu ou en fin de repas** pour une **meilleure tolérance digestive**.

La posologie prescrite doit être atteinte progressivement pour éviter les effets indésirables.

Par exemple, on commence à 1 comprimé par jour pendant quelques jours, puis 2 comprimés par jour pour quelques jours, jusqu'à atteindre la dose prescrite.

OUBLI ? Prenez simplement la prise suivante, sans doubler la dose.



Quel délai entre le début du traitement et quel effet sur vos glycémies ?

Effet dès les premières prises du médicament.

Le traitement pourra être adapté en fonction des résultats : vos mesures de glucose et l'hémoglobine glyquée HbA1C (reflet glycémique global des 3 derniers mois).



Quels effets indésirables possibles ? Quelles précautions à prendre ?

Concernant les effets secondaires possibles de ce médicament, reportez-vous à la notice et si besoin, parlez-en à votre médecin.

Dans la pratique, il est le plus souvent rapporté des troubles digestifs **passagers en début de traitement** : diarrhées, légers maux d'estomac, nausées.

- Augmenter progressivement le nombre de comprimés et les prendre en milieu ou fin de repas réduit les troubles digestifs. En cas de persistance, parlez-en à votre médecin.
- En cas de radio avec l'injection d'un produit de contraste ou anesthésie générale, dites que vous prenez un traitement par Metformine.



Signalez toujours votre diabète et votre traitement à tous les professionnels de santé.

Ne prenez pas un autre médicament de vous-même, sans le conseil de votre médecin ou de votre pharmacien. Données scientifiques, efficacité, sécurité... Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à en discuter avec eux !

À
RETENIR

Utilisé seul, ce médicament n'est pas à risque d'hypoglycémie.

- Je prends mes comprimés en mangeant, en milieu ou en fin de repas.
- Au début du traitement, j'augmente progressivement le nombre de comprimés.
- Les éventuels troubles digestifs en début de traitement disparaissent en quelques semaines. Si ce n'est pas le cas, j'en parle à mon médecin.

Les médicaments complètent les bénéfices d'une alimentation et d'une activité physique adaptées.

