



Pour votre diabète, votre médecin vous a prescrit **BYETTA** :

À la dose de ..... microgrammes ( $\mu\text{g}$ ) 2 fois par jour, pendant ....., puis .....  $\mu\text{g}$  2 fois par jour

Ce médicament appartient à la famille des Analogues du GLP-1.



## Comment agit votre médicament ?

Il stimule la sécrétion d'insuline produite par votre pancréas, dès que la glycémie augmente (l'insuline est l'hormone qui fait baisser la glycémie).

Il bloque la sécrétion d'une autre hormone (le glucagon) qui fait augmenter le taux de sucre dans le sang,

Il ralentit un peu la vidange de l'estomac, le glucose apparaît moins vite dans la circulation après le repas.

Dans certains cas, il peut diminuer la sensation de faim et favoriser une perte de poids.



## Quand faire l'injection ?

Pour une bonne tolérance, faites la 20 à 25 minutes (maximum 1h) avant le petit déjeuner ou le dîner. Elle ne doit pas être faite après un repas. Les injections doivent être séparées d'au moins 6 heures.

**OUBLI ? Faites simplement l'injection suivante à l'heure habituelle sans doubler la dose.**

**Avant de réaliser l'injection, lavez-vous les mains.**

**Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection.**



## Comment conserver votre médicament ?

Les stylos d'avance se conservent au réfrigérateur (2-8°C).

Le stylo en cours d'utilisation peut être conservé 1 mois à température ambiante, à l'abri de la lumière, puis doit être jeté.



## Quel délai entre le début du traitement et quel effet sur vos glycémies ?

Les glycémies peuvent s'améliorer dès les premiers jours du traitement.

Le traitement pourra être adapté en fonction des résultats : vos mesures de glucose et l'hémoglobine glyquée HbA1C (reflet glycémique global des 3 derniers mois).



## Quels effets indésirables possibles ?

Concernant les effets secondaires possibles de ce médicament, reportez-vous à la notice et si besoin, parlez-en à votre médecin.

Dans la pratique, il est le plus souvent rapporté des troubles digestifs **passagers en début de traitement** : pesanteurs de l'estomac, nausées.



**Signalez toujours votre diabète et votre traitement à tous les professionnels de santé.**

Ne prenez pas un autre médicament de vous-même, sans le conseil de votre médecin ou de votre pharmacien. Données scientifiques, efficacité, sécurité... Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à en discuter avec eux !

## À RETENIR

- Je fais une injection après un repas.
- J'attends au moins 6h entre deux injections.
- Les éventuels troubles digestifs en début de traitement disparaissent en quelques semaines. Si ce n'est pas le cas, j'en parle à mon médecin.

Les médicaments complètent les bénéfices d'une alimentation et d'une activité physique adaptées.

