

Traitement du diabète de type 2

Bon Usage du Médicament

Pour traiter votre diabète et améliorer vos glycémies, votre médecin vient de vous prescrire un médicament de la famille **des INHIBITEURS du SGLT2**

le

À la posologie de comprimé(s), fois par jour

(si 2 prises/j = forme combinée : donnez aussi la fiche BIGUANIDES)

Comment agit votre médicament ?

Il conduit à l'élimination d'une quantité plus importante de glucose dans les urines.

Quand prendre votre médicament ?

Si médicament à prendre 1 fois/j : Choisissez matin, midi ou soir, pendant ou en dehors des repas, puis gardez ce moment. Si vous oubliez de le prendre, ne doublez pas la dose à la prise suivante.

Si médicament à prendre 2 fois/j : 1 comprimé matin et soir, au milieu ou en fin de repas, pour une meilleure tolérance.

Si vous oubliez de le prendre, ne doublez pas la dose à la prise suivante.

Quel délai entre le début du traitement et l'effet sur vos glycémies ?

Les glycémies peuvent s'améliorer dès les premiers jours de traitement.

Le traitement sera revu et pourra être adapté en fonction de vos résultats : carnet de surveillance glycémique et hémoglobine glyquée = HbA1c (reflet glycémique global des 3 derniers mois).

Quels sont les principaux effets indésirables possibles ?

Concernant les effets secondaires possibles de ce médicament, reportez-vous à la notice, et si besoin, parlez-en à votre médecin.

Dans la pratique, il est le plus souvent rapporté :

- Un plus grand risque d'infection ou de mycose génitale (infection par un « champignon »)
- Plus fréquemment chez la femme, surtout si elle présente facilement ce type d'infections.

Utilisé seul ce médicament est à faible risque d'hypoglycémie

Quelques précautions à prendre :

- Avoir une très bonne hygiène intime. Après avoir uriné, séchez-vous bien, éventuellement utilisez une lingette.
- Au premier signe anormal au niveau génital, voyez sans attendre votre médecin.

Avant de prendre un autre médicament de vous-même, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Vous devez toujours signaler votre diabète et votre traitement à tous les professionnels de santé.

***** A retenir *****

- **Je prends mon traitement tous les jours au moment choisi.**
- **Je prends soin de mon hygiène intime, et contacte mon médecin au 1er signe anormal au niveau génital.**
- **Vous prenez ce médicament matin et soir ? il est combiné à la Metformine, la fiche biguanides vous concerne et tout aussi importante.**