
Vaccination et diabète

Certaines infections sont plus virulentes chez les personnes vivant avec un diabète.

Une infection peut déséquilibrer le diabète.



Parlez-en à vos professionnels de santé

Diabète Occitanie
Tous acteurs face au Diabète

URPS Infirmiers Libéraux Occitanie

URPS Médecin d'Occitanie

URPS Pharmaciens Occitanie

URPS Biologistes Occitanie

AFD Association des Diabétiques Occitanie

Se vacciner, c'est se protéger et protéger son entourage

Je crée mon carnet de vaccination électronique sur « *Mon espace santé* »

Diabète, mon calendrier vaccinal

Vaccin	Age	Fréquence	Pourquoi ?
Les vaccins saisonniers fortement recommandés			
Grippe	Adultes	1 injection par an Automne-hiver	Prévention des formes graves d'infections virales saisonnières
COVID-19	Adultes	1 injection par an automne-hiver (2 / an chez les sujets âgés, fragiles)	Prévention des formes graves d'infections virales saisonnières
Les vaccins non saisonniers à ne pas oublier			
DTP + Coqueluche	25, 45, 65 ans...	Tous les 20 ans, puis tous les 10 ans > 65 ans	Maladies graves, souvent oubliées
Pneumocoque	Adultes	1 dose	Prévention des pneumonies, septicémies
Zona	Adultes	2 doses (à 2 mois d'intervalle)	Évite la survenue de la maladie et les douleurs post-zona
Virus hépatite B (VHB)	Adultes	3 doses : intervalle de 1 à 2 mois entre les 2 premières doses et de 6 mois entre la 1re et la 3e dose	Prévention des complications liées à l'hépatite B, plus fréquentes chez les personnes atteintes de diabète. Indication formelle en cas de dialyse ou de greffe
Virus respiratoire syncytial (VRS)	> 75 ans > 65 ans en cas d'insuffisance cardiaque ou respiratoire	1 dose	Prévention des infections respiratoires

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Diabète Occitanie-octobre 2026.